

DICIONÁRIO DA CIRURGIA PLÁSTICA

descubra o significado dos
principais termos usados
na cirurgia plástica



BELVIVERE

GLOSSÁRIO DO CIRURGIÃO PLÁSTICO

Fibrose

Podemos dizer que a fibrose é uma cicatriz interna que é formada em todos os locais de um processo cirúrgico. Ela está presente todas as cirurgias plásticas, principalmente a lipoaspiração e a abdominoplastia. Caso ela seja pequena e controlada, ela é absolutamente normal e faz parte da recuperação do corpo . Contudo, caso ocorram irregularidades na região da cirurgia, isso quer dizer que há uma fibrose anormal.

Diástase Abdominal

É o afastamento dos músculos que ocorre geralmente durante a gravidez. É considerada a principal causa de flacidez abdominal após o parto.

Este afastamento dos músculos abdominais pode chegar a 10 centímetros e se deve à fraqueza do músculo “reto abdominal”, que fica extremamente esticado durante o período gestacional.

Pode ocorrer também em pessoas que eram obesas e perderam peso muito rápido ou em pessoas “barrigudinhas”, que tem “efeito sanfona”.

O músculo “reto abdominal” é mais fraco em pessoas sedentárias.

Ptose Mamária

A ptose mamária é um distúrbio estético e anatômico caracterizado pela descida da mama por relaxamento dos tecidos de sustentação. Muitos conhecem também como “mamas caídas”, “seios caídos”, “seios flácidos”. Os principais fatores que ocasionam a flacidez e a queda das mamas são: variação de peso, gravidez, amamentação, menopausa, genético.

O Tratamento da ptose mamária é a cirurgia de MASTOPEXIA.

Mastopexia

É a cirurgia que tem o objetivo de remodelar e levantar os seios flácidos e caídos, a chamada ptose mamária. Esse procedimento também é chamado de lifting de mamas.

Onfaloplastia

É a a cirurgia plástica para a correção estética do umbigo

Cola Cirúrgica

É uma alternativa para otimizar a cicatrização da pele.

Ela se cristaliza em 60 segundos e cria rapidamente uma barreira contra microrganismos, diminuindo assim riscos de infecção.

A cola cirúrgica é 7 vezes mais forte do que as suturas comuns, é impermeável a água, não precisa ser trocada, e é retirada após 15-30 dias. Por todas essas vantagens, a cola cirúrgica acelera a regeneração dos tecidos, o que diminui o tamanho da cicatriz e facilita o pós-operatório.

Na Belvivere utilizamos fios de sutura e cola cirúrgica para garantir uma melhor qualidade das cicatrizes e maior segurança das cirurgias.

Kinesio Taping ou Taping

É uma técnica de bandagem funcional com propriedades elásticas realizada através do uso de fita de Kinesio (Kinesio Tape), o material possui como características: 100% algodão, não contém látex, e possui elasticidade.

Quando aplicada na pele, ocasiona estímulos mecânicos e sensoriais.

Seus resultados são exclusivos baseados na fisiologia e na forma como ela é aplicada, utilizando a forma, direção e tensão correta, proporcionando diversos benefícios associados aos tratamentos na Estética.

Dentre principais objetivos do **Taping no pós operatórios na cirurgia plástica:**

- Melhora na função Linfática, reduzindo edemas proporcionados pela cirurgia.
- Alívio da dor, através do sistema analgésico que ocorre pela estimulação sensorial dos receptores mecânicos da pele,
- Melhora de hematomas e cicatrizes

Seroma

Trata-se do acúmulo de líquido abaixo da pele. Ela pode aparecer depois de qualquer cirurgia, especialmente daquelas em que há manipulação da pele e do tecido adiposo. Entre os procedimentos estéticos que podem causar seromas estão a lipoaspiração, a abdominoplastia e a mamoplastia.

Na maioria dos casos ele é benigno e pode ser tratado clinicamente. O seroma deve ser tratado para não evoluir para o que chamamos de seroma encapsulado.

Para prevenir o seroma o ideal é evitar espaços mortos abaixo da pele. Para isso aplicamos pontos de adesão. Essas suturas aplicadas abaixo da pele EVITAM O USO DE DRENOS, diminuem a incidência de seroma e hematomas, além de diminuir a tensão na pele e melhorar o resultado estético das cicatrizes.

Hematoma

Por definição, é uma coleção de sangue que pode acontecer dentro da mama ou abaixo da pele. Em alguns casos ele pode ser tratado clinicamente, mas muitas vezes é necessária intervenção cirúrgica para drenar o acúmulo de sangue.

riscos de um hematoma

- desenvolvimento de infecções
- lesão dos tecidos adjacentes por compressão

causas de hematoma

- Pressão arterial alta depois do procedimento.
- Doenças de coagulação do sangue.
- Esforço físico excessivo
- A ingestão de certos medicamentos

Capsula / Contratura capsular

A cápsula é a cicatriz que se forma ao redor do implante de silicone.

O encapsulamento de prótese de silicone se caracteriza pelo mais espessamento dessa membrana. A cápsula começa a apertar a prótese e, com o passar do tempo, ele é cada vez mais comprimido. A contratura ocorre em até 20% das pacientes após mamoplastia primária.

Blefaroplastia

É a cirurgia das pálpebras. O objetivo desse procedimento é a retirada das bolsas de gordura e da pele das pálpebras superiores e inferiores. Nas pálpebras inferiores normalmente é necessário uma suspensão lateral para evitar a queda do olho, a Cantopexia lateral.

Cantopexia

A cantopexia é um procedimento de suporte indicado para a fixação do canto lateral em posição súpero lateral, dando um apoio à pálpebra inferior. É um procedimento bastante utilizado para tratamento e prevenção de várias desordens da pálpebra inferior, em cirurgias estéticas e reparadoras

Lipoaspiração

É a cirurgia para tratamento de gordura localizada. Com a utilização de cânulas, a gordura é aspirada por um Lipoaspirador.

Uma infiltração prévia com soro fisiológico e adrenalina é utilizada para facilitar a retirada da gordura e diminuir o sangramento.

O volume máximo aspirado não deve ultrapassar 7% do peso corporal. A Lipoaspiração evoluiu com modernas tecnologias como a Lipoaspiração Ultrasônica, a lipo a laser e a Vibrolipoaspiração

Lipoescultura

A diferença entre lipoaspiração e lipoescultura está no fato de que a primeira apenas reduz o volume das regiões escolhidas, enquanto a segunda faz a redução de algumas regiões e o aumento de outras por meio do enxerto de gordura

Mamoplastia

A mamoplastia é toda cirurgia plástica que transforma e modifica o formato das mamas, tendo por objetivo torná-lo mais harmonioso e proporcional ao restante do corpo. Elas podem aumentar, diminuir ou mesmo alterar a aparência dos seios.

Ginecomastia

É uma condição masculina resultante do aumento das mamas masculinas. Essa condição masculina é resultante do aumento do volume mamário que pode ser de componente glandular (glândula mamária), adiposo (gordura) ou ambas.

Na maioria dos casos, a solução para o problema é cirúrgica. A cirurgia mais comum é a remoção parcial da glândula mamária associada à retirada da gordura por meio da lipoaspiração.

Xantelasma

São lesões decorrentes de acúmulo de colesterol na região peri-palpebral.

Surgem como lesões amareladas em forma de placas. São melhor tratadas com a ressecção isolada de cada placa e sutura. Existe recorrência.

QUELÓIDE X CICATRIZ HIPERTRÓFICA

É uma doença cicatricial caracterizado por um crescimento anormal de tecido cicatricial que se forma no local de um traumatismo, corte ou cirurgia de pele. Ele é causado pelo excesso de colágeno e fibrose na pele que acontece devido a um processo demasiado de cicatrização; é como se as células não soubessem o momento certo de parar de produzir um novo tecido para a pele. .

Existem dois principais tipos de cicatrizes indesejáveis: as hipertróficas e os queloides, ambas são reflexos de um processo exagerado de cicatrização que formam marcas elevadas, avermelhadas ou acastanhadas - que podem ser acompanhadas de coceira no local. Embora sejam similares, há algumas diferenças entre as lesões:

CICATRIZ HIPERTRÓFICA: esse tipo não ultrapassa os limites da lesão, ou seja, não cresce além da linha do corte, atingindo apenas a pele ao redor. São cicatrizes elevadas, mas que não se tornam mais largas que a lesão inicial.

QUELÓIDE: ocorre uma elevação nos tecidos ao redor da cicatriz inicial, acometendo uma área onde antes não havia cicatriz. Um exemplo comum de lesões queiloideanas são os nódulos que ocorrem no lóbulo da orelha após colocação de brincos. Pacientes negros e orientais possuem maiores chances de desenvolver queiloide.

